

ほけんたより

令和6年1月
みどり保育所

寒い日が続きますね。今、保育所では、様々な感染症にかかる子どもさんがみられます。その中でも、アデノウイルス感染症にかかる子どもさんが増えています。今回は、アデノウイルス感染症について、お知らせします。

アデノウイルス感染症

- 1歳から4歳に多くみられますが、最近では5歳から10歳でも発生しています。
大人にも感染し、家庭内で拡がるケースもあります。
- 春から夏にかけて発生することが多いのですが、冬のインフルエンザと同時期に発生することもあり、あまり、季節性がなくなりました。
- ウイルスには、50種類くらいのタイプがあり、タイプにより発生する症状が異なります。

感染経路



鼻水等からの飛沫感染が主ですが、ウイルスのついた部分を触る接觸感染もあります。
目に、便からの感染もあり、口、鼻、目の粘膜、眼の結膜から体の中に入ります。

潜伏期

5~7日、長いです

症状

呼吸器感染症

のどの腫れ(扁桃炎)や、痛み
咽喉炎、咳
鼻水、鼻づまり
発熱(38~40度位の熱が4~5日続く
1週間以上続くこともあります)
耳たぶ、周囲や、くびのリリヤ節の腫れ



 咽頭結膜熱
(のどと目の結膜の炎症)
は、ポール熱と呼ばれます

中耳炎を合併することも
あります



流行性角結膜炎

目の充血、目やけ(眵)、眼の痛み、痒み

胃腸炎

嘔吐、下痢、症状がひどければ高熱であります。



①出血性膀胱炎 尿に血が混じることがあります

②乳幼児では、時に重い全身症状と起こることがあり、急速に進行する肺炎や、肝炎、脳炎を合併することがあります

治療

特効薬はないので、症状を和らげる薬を服用して、ウイルスが体外に排出されいくのを待ちます。

③こんな時は早めにもう一度受診しましょう

- 前日のと比べて、どんどん悪くなっています。
- 元気はあるが、38度以上の熱が3日以上続いている。

④感染力が強いので、お風呂やタオル、洗面用具、食器を別にすむなど、家庭内で感染を防げない工夫をしましょう。

アデノウイルスの消毒法(食器、タオルなどの消毒に)

- アルコールは効きづらいので、塩素系消毒液、6%濃度のもの(ハイター)を使います。
- 2㍑の水に、ハイター1杯(約20ml)を入れましょう。
- 食器、タオル等の他にドアノブ、電気のスイッチ等を式くことにも使います。
- 消毒液に10分程度浸し、その後、水洗いします。スイッチ等は、10分後、水拭きします。
- 布類は、消毒の後、洗濯をしましょう。

予防

手洗い・うがい、が一番です。
のどからは…1~2週間、便からは…3~5週間位ウイルスが排出されます
感染者との密接な接触はなるべく避けましょう。



食べ物

- のどの痛み、高熱で食欲は落ちます。

無理してたくさん食べらる必要はなく、少しづつ細めに摂りましょう

フリード・セリー・アイスクリーム・冷ましたおじや・とうふ・冷めたグラタン等です。

水分補給には、経口補水液(OJー、シリカ顆粒など)

麦茶、ミネラルウォーター、牛乳、冷めたみぞ汁、オターミー等です

・嘔吐、下痢があつ場合は、脂肪分の少ない物と少しずつ摂りましょう。



出席停止について

アデノウイルスの感染力は、大変強いのです。

熱が下がつても2日位は、感染力があります

・高熱とのど症状のみであれば出席停止にはなりませんが、

・ポール熱(咽頭結膜熱)では、症状があつまつから2日

・けやき目では、症状があつまつした時点で登所が許可されます。

※何よりも、主治医のDnとよく相談しながら、登所をしましょう。

